

# Mereäärised loopealsed ehk ranna-alvarid



Aas-kurereha

## Mereäärised loopealsed ehk ranna-alvarid

Virtsu ümbruse lahtedäärsetel Limnea staadiumi rannavallide klübukujatistel ja paekõvikutel esineb paiguti, eriti ida pool, Pivarootsi ümbruses, loopealseid e. alvareid. Need nn. ranna-alvarid on omapärase struktuuri ja liigilise koosseisuga. Esineb loopealsetele tüüpilisi taimekooslusi, mille hulgas võib leida rannikule iseloomulikke liike, kuna kõrgemad klübuvallid ja paekõvikud on küllalt hiljuti olnud kõrgveeseisu ajal merest ümbritsetud ja praegu levivad nendel tasandikel paiguti soostunud rannaniidud.

Veel paarkümmend aastat tagasi esinesid need kooslused märkimisväärselt suurte kontuuridena, kuid praegu on nad suurel määral kadastumas. Puhtu-Laelatu kaitsealal leiduvatest poollooduslikest kuivadest (pöösastunud) niitudest kujutab umbes 40% endast taolisi ranna-alvareid. Samuti on endistest ranna-alvaritest aja jooksul kujunenud kadastikud rohumaal, mida kaitsealal on ligi 60 ha, kuid mille päritolu on praegu raske määratleda.

Pivarootsi ümbruse loopealsed on märkimisväärselt suure liigilise mitmekesisusega, paiguti on seal registreeritud üle 40 liigi ruutmeetri kohta, mis on väga kõrge näitaja isegi liigirikaste aruniitude jaoks.

Loopealsed kuuluvad Eestis kaduvate poollooduslike biotoopide hulka, peamiselt lambakasvatuse märkimisväärse vähenemise tõttu viimastel aastakümnetel; seetõttu tuleks iga säilinud liigirikast loopealset käsitleda, kui haruldast loodusobjekti. Loopealsete kaitse saab tagatud olla ainult karjatamisega, muud abinõud, nt. regulaarne puhastamine võsast, ei anna piisavalt püsivaid soovitud tulemusi.

Virtsu ja Pivarootsi ümbruse rannikulähedased loopealsed on suures osas ilma karjatamiskoormuseta ning seetõttu kadastunud või kadastumas.



Kurekell



Metsmaasikad



Haisev kurereha



Alvar



Loopealsete värvikirevus jääb suve keskele või teise poolele



Kukerpuu ehk paburitski ehk barbariss



Alvar



Õunapuu Puhtu rannas klibil



Keskmine värhein



Alvar